

التطعيم ضد عدوى COVID-19

كيف تؤثر عليّ عدوى COVID-19؟

- يمكن أن يسبب فيروس COVID-19 عدوى صدرية يصاحبها ارتفاع بالحرارة وصعوبة في التنفس وأوجاع في العضلات أو الجسم.
- كبار السن أكثر عرضةً لدخول المستشفى إذا أصيبوا بـ COVID-19.

كيف يساعدني لقاح COVID-19 ؟

- يقلل أخذ لقاح COVID-19 مرة كل 6 شهور من الحاجة لدخولك إلى المستشفى إذا أصبت بهذه العدوى.
- متى أستطيع أخذ لقاح COVID-19؟
- إذا كانت سنك بين 65 و74 عاماً: مرة كل 12 شهراً (مرة كل 6 شهور إذا كنت تعيش في دار لرعاية المسنين)
- إذا كانت سنك 75 عاماً أو أكثر: مرة كل 6 شهور

ما هي الآثار الجانبية الشائعة للقاح COVID-19؟

- الآثار الجانبية الشائعة لهذا اللقاح هي ألم أو تورم أو احمرار في موضع الحقنة، وارتفاع بالحرارة ووجع في العضلات.
- تزول هذه الأعراض لوحدها بعد يومين أو ثلاثة أيام.
- يساعد تناول باراسيتامول على تخفيف الألم وخفض ارتفاع الحرارة ووجع العضلات.

لماذا احتاج إلى أخذ لقاح COVID-19 مرة كل 6 شهور؟

- تخفّ الحماية التي يعطيها اللقاح مع مرور الوقت.
- للحصول على حماية جيدة، يتعيّن على كبار السن أخذ اللقاح مرّة كل 6 شهور.

أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟

- راجع طبيبك العام.
- تتوفر أيضاً نشرة فيها أسئلة شائعة عن لقاحات COVID-19 (بالإنكليزية فقط) - يُرجى مسح رمز QR:

