

التطعيم ضد عدوى المكورات الرئوية

كيف تؤثر عليّ عدوى المكورات الرئوية (pneumococcal)؟

- يمكن أن تسبب عدوى في الدم أو الدماغ أو الصدر أو أجزاء أخرى في الجسم.
- كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والمعاناة من مرض أشد حدة.
- يموت 3 من كل 10 أشخاص يصابون بعدوى المكورات الرئوية في الدماغ.

كيف يساعدني لقاح المكورات الرئوية؟

- يقلل أخذ لقاح المكورات الرئوية من احتمال تعرضك للإصابة بالعدوى الخطيرة في الدم والدماغ والصدر.

ما هي أنواع لقاحات المكورات الرئوية؟

- يوجد نوعان من لقاحات المكورات الرئوية - أسماؤهما التجارية هي:
Prevenar -

و

Pneumovax -

- يمنحك Prevenar حماية أقوى تدوم لمدة أطول.
- يمنحك Pneumovax حماية من المزيد من سلالات الجرثومة.

متى أستطيع أخذ لقاح المكورات الرئوية؟

- إذا كانت سنك 70 عاماً أو أكثر: جرعة واحدة من Prevenar
- استفسر من طبيبك إذا كنت أيضاً بحاجة لـ Pneumovax (جرعتان).

ما هي الآثار الجانبية المحتملة للقاح المكورات الرئوية؟

- يُعاني حوالي واحد من كل 5 أشخاص من تورم أو احمرار أو ألم في موضع الحقنة أو ارتفاع بالحرارة - تزول هذه الآثار الجانبية لوحدها بعد يومين أو ثلاثة أيام.
- أحياناً يحصل ورم في موضع الحقنة وقد يستمر لبضعة أسابيع أو شهور، ولكنه لا يحتاج لعلاج.
- يساعد تناول باراسيتامول على تخفيف الألم وخفض ارتفاع الحرارة.

أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟

- راجع طبيبك العام.
- تتوفر أيضاً نشرة فيها 'أسئلة شائعة' عن لقاحات المكورات الرئوية (بالإنكليزية فقط) - يُرجى مسح رمز QR:

