

COVID-19 感染与疫苗接种

COVID-19 会对我造成什么影响？

- COVID-19 可能会引起胸部感染，伴有发烧、呼吸困难、肌肉或全身酸痛。
- 年纪较大的COVID-19患者更有可能需要住院。

COVID-19 疫苗有什么作用？

- 如果每6个月打一次 COVID-19 疫苗，那么一旦感染，需要住院治疗的可能性也比较小。

我什么时候可以打COVID-19 疫苗？

- 65 至 74 岁：每 12 个月（如果您住在养老院，则每6个月）一次
- 75 岁及以上：每6个月一次

COVID-19 疫苗有哪些常见副作用？

- 打疫苗之后，注射部位常常会出现疼痛、红肿；发烧和肌肉酸痛也很常见。
- 两三天之后，这些会自行消失。
- 扑热息痛（Paracetamol）或许可以缓解疼痛、发烧和肌肉酸痛。

为什么我需要每6个月打一次 COVID-19 疫苗？

- 随着时间的推移，疫苗的保护作用会逐渐减弱。
- 为了提供良好的保护，年纪较大的人应该每6个月打一次疫苗。

在哪里可以找到更多信息？

- 向全科医生咨询。
- 还可以阅读《COVID-19 疫苗常见问题解答》(仅有英文版)，请扫描下列QR码：

