

肺炎球菌感染与疫苗接种

感染肺炎球菌会对我造成什么影响？

- 肺炎球菌可能导致血液、大脑、胸部或身体其他部位的感染。
- 年纪较大的人更容易受到感染，病情可能更严重。
- 肺炎球菌脑部感染患者每10人中就有 3 人死亡。

肺炎球菌疫苗有什么作用？

- 打了肺炎球菌疫苗的人，患上严重的血液、脑部和胸部感染的可能性较小。

有哪些不同的肺炎球菌疫苗？

- 肺炎球菌疫苗有两种，品牌名称分别是：
 - Prevenar
 - 和
 - Pneumovax
- Prevenar 预防作用比较强，持续时间比较长。
- Pneumovax 可以预防的菌株比较多。

我什么时候可以打肺炎球菌疫苗？

- 70 岁及以上：1 剂 Prevenar
- 询问医生您是否还需要打 Pneumovax（2 剂）。

肺炎球菌疫苗有哪些常见副作用？

- 每5人当中大约有1人会出现注射部位红肿或疼痛，或者会发烧，这些都会在两三天后自行消失。
- 有时候，注射部位会出现肿块，可能会持续几周或几个月——这种情况不需要治疗。
- 扑热息痛（Paracetamol）或许可以缓解疼痛和发烧。

从哪里可以获得更多信息？

- 向全科医生咨询。
- 还可以阅读《肺炎疫苗常见问题解答》(仅有英文版)，请扫描下列QR码：

