

COVID-19感染與疫苗接種

COVID-19 會對我造成什麼影響？

- COVID-19 可能會引起胸部感染，伴有發燒、呼吸困難、肌肉或全身疼痛。
- 年紀較大的COVID-19患者更有可能需要住院。

COVID-19 疫苗有什麼作用？

- 如果每6個月打一次COVID-19疫苗，那麼即使感染，需要住院治療的可能性也比較小。

我什麼時候可以打 COVID-19 疫苗？

- 65 至 74 歲：每 12 個月（如果您住在養老院，則每 6 個月）一次
- 75 歲及以上：每 6 個月一次

COVID-19 疫苗有哪些常見副作用？

- 打疫苗后，注射部位常常會出現疼痛、紅腫；發燒和肌肉酸痛也很常見。
- 兩三天之后，這些會自行消失。
- 扑熱息痛（Paracetamol）或許可以緩解疼痛、發燒和肌肉酸痛。

為什麼我需要每6個月打一次 COVID-19 疫苗？

- 隨著時間的推移，疫苗的保護作用會逐漸減弱。
- 為了提供良好的保護，年紀較大的人應該每6個月打一次疫苗。

在哪裡可以找到更多資訊？

- 向全科醫生諮詢。
- 還可以閱讀《COVID-19 疫苗常見問題解答》（僅有英文版），請掃描下列QR碼：

