

肺炎球菌感染與疫苗接種

感染肺炎球菌會對我造成什麼影響？

- 肺炎球菌可能導致血液、大腦、胸部或身體其他部位的感染。
- 年紀較大的人更容易受到感染，病情可能更嚴重。
- 肺炎球菌腦部感染患者每 10 人中就有 3 人死亡。

肺炎球菌疫苗有什麼作用？

- 接種了肺炎球菌疫苗的人，患上嚴重的血液、腦部和胸部感染的可能性較小。

有哪些不同的肺炎球菌疫苗？

- 肺炎球菌疫苗有兩種，品牌名稱分別是：
 - Prevenar和
 - Pneumovax
- Prevenar 預防作用比較強，持續時間比較長。
- Pneumovax 可以預防的菌株比較多。

我什麼時候可以打肺炎球菌疫苗？

- 70 歲及以上：1 劑 Prevenar
- 詢問醫生您是否還需要接種 Pneumovax（2 劑）。

肺炎球菌疫苗有哪些常見副作用？

- 每 5 人當中大約有 1 人會出現注射部位紅腫或疼痛，或者會發燒，這些都會在兩三天后自行消失。
- 有時候，注射部位會出現腫塊，可能會持續幾週或幾個月——這種情況不需要治療。
- 扑熱息痛（Paracetamol）或許可以緩解疼痛和發燒。

在哪裡可以找到更多資訊？

- 向全科醫生諮詢。
- 還可以閱讀《肺炎疫苗常見問題解答》(僅有英文版)，請掃描下列QR碼：

