

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Πώς με επηρεάζει η πνευμονιοκοκκική λοίμωξη;

- Μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη του αίματος, του εγκεφάλου, του θώρακα ή σε άλλα μέρη του σώματος.
- Οι ηλικιωμένοι είναι πιο πιθανό να πάθουν τη λοίμωξη, και να αισθάνονται πιο άρρωστοι.
- 3 στα 10 άτομα με πνευμονιοκοκκική λοίμωξη του εγκεφάλου θα πεθάνουν.

Πώς βοηθά το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου;

- Η λήψη του εμβολίου σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να έχετε σοβαρές λοιμώξεις του αίματος, του εγκεφάλου και του θώρακα.

Ποια είναι τα διαφορετικά εμβόλια πνευμονιόκοκκου;

- Υπάρχουν δύο τύποι πνευμονιοκοκκικών εμβολίων – οι εμπορικές ονομασίες είναι
- Prevenar
και
- Pneumovax.
- Το Prevenar σας προσφέρει ισχυρότερη προστασία που διαρκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Το Pneumovax σας προστατεύει από περισσότερα στελέχη του μικροβίου.

Πότε μπορώ να κάνω το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου;

- 70 ετών και άνω: 1 δόση Prevenar
- Ρωτήστε τον γιατρό σας εάν χρειάζεστε επίσης Pneumovax (2 δόσεις).

Ποιες είναι οι συχνές παρενέργειες του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου;

- Περίπου 1 στα 5 άτομα θα έχουν οίδημα (πρήξιμο), ερυθρότητα ή πόνο στο σημείο της ένεσης ή πυρετό – αυτά εξαφανίζονται από μόνα τους μετά από 2 έως 3 ημέρες.
- Μερικές φορές ένα εξόγκωμα αναπτύσσεται στο σημείο της ένεσης και μπορεί να διαρκέσει για λίγες εβδομάδες ή μήνες – αυτό δεν χρειάζεται θεραπεία
- Η παρακεταμόλη μπορεί να βοηθήσει με τον πόνο και τον πυρετό.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

- Μιλήστε με τον γιατρό (GP) σας.
- Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου είναι επίσης διαθέσιμες (μόνο στα αγγλικά) – σαρώστε τον κωδικό QR:

