

## **PNEUMOCOCCO – INFEZIONE E VACCINAZIONE**

### **Quali ripercussioni ha l'infezione pneumococcica sulla mia salute?**

- Può causare infezione del sangue, del cervello, dei polmoni e di altre parti del corpo.
- Le persone anziane hanno maggiori probabilità di contrarre l'infezione e di stare più male.
- 3 persone su 10 affette da infezione pneumococcica del cervello moriranno.

### **In quale modo il vaccino per il pneumococco può essere d'aiuto?**

- Se ricevi il vaccino avrai meno probabilità di accusare gravi infezioni del sangue, del cervello e dei polmoni.

### **Quali sono i diversi vaccini per il pneumococco?**

- Vi sono due tipi di vaccini per il pneumococco – i loro nomi commerciali sono  
-Prevenar  
e  
-Pneumovax.
- Il Prevenar ti offre una maggiore protezione che dura per un periodo più lungo.
- Il Pneumovax ti protegge da più ceppi del microbo.

### **Quando posso ricevere il vaccino per il pneumococco?**

- Se sei di età pari o superiore a 70 anni: 1 dose del Prevenar
- Chiedi al medico se hai anche bisogno del Pneumovax (2 dosi).

### **Quali sono gli effetti collaterali più comuni del vaccino per il pneumococco?**

- Circa 1 persona su 5 accuserà gonfiore, rossore o dolore nel punto dell'iniezione o febbre – tali effetti scompariranno spontaneamente dopo 2-3 giorni.
- Talvolta potresti notare una protuberanza nel punto dell'iniezione che dura per alcune settimane o alcuni mesi – non è necessario ricorrere ad alcun trattamento.
- Il paracetamolo può contribuire a lenire il dolore e la febbre.

## Dove posso ottenere maggiori informazioni?

- Parla con il tuo medico di base (GP).
- Sono anche disponibili domande più frequenti sui vaccini per il pneumococco (solo in inglese) – fai la scansione del codice QR:

