

NHIỄM PHẾ CẦU KHUẨN VÀ CHÍCH NGỪA

Nhiễm phế cầu khuẩn ảnh hưởng tôi ra sao?

- Phế cầu khuẩn có thể gây nhiễm trùng máu, não, ngực hoặc các nơi khác trong cơ thể.
- Người lớn tuổi có nhiều khả năng bị nhiễm trùng hơn, và bị bệnh nặng hơn.
- 3 trong 10 người bị nhiễm phế cầu khuẩn trong não sẽ chết.

Vắc-xin phế cầu khuẩn giúp ích ra sao?

- Chích ngừa có nghĩa là quý vị sẽ ít có khả năng bị nhiễm trùng máu, não và ngực nặng hơn.

Các bao nhiêu loại vắc-xin phế cầu khuẩn?

- Có hai loại vắc-xin phế cầu khuẩn – tên thương hiệu là
 - Prevenar
 - và
 - Pneumovax.
- Prevenar bảo vệ quý vị mạnh hơn và lâu hơn.
- Pneumovax bảo vệ quý vị chống lại nhiều chủng loại vi khuẩn hơn.

Khi nào tôi có thể chích ngừa phế cầu khuẩn?

- 70 tuổi trở lên: 1 liều Prevenar
- Hỏi bác sĩ xem quý vị cũng cần chích ngừa Pneumovax (2 liều) hay không.

Tác dụng phụ thường có của vắc-xin phế cầu khuẩn là gì?

- Khoảng 1 trong 5 người sẽ bị sưng, đỏ hoặc đau ở chỗ chích, hoặc bị sốt –những tác dụng phụ này sẽ tự hết sau 2 đến 3 ngày.
- Đôi khi có thể có cục u ở chỗ chích trong vài tuần hoặc vài tháng –không cần chữa trị gì hết.
- Paracetamol có thể giúp giảm đau và hạ sốt.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

- Hỏi bác sĩ gia đình.
- Cũng có các câu hỏi thông thường về vắc-xin phế cầu khuẩn (chỉ có bằng tiếng Anh) – xin quét mã QR:

